

AQ-10 (версия за тийнейджъри - 12 – 15 г.)

Коефициент за аутистично разстройство

Кратко оценяване на поведението на тийнейджъри (12 - 15 г.) при съмнение за аутистично разстройство. Оценката се извършва от родител/ възрастен, ангажиран с отглеждането на детето.

Моля, отбележете само по един отговор на всяко твърдение:

Напълно
съгласен

По-скоро
съгласен

По-скоро
несъгласен

Напълно
несъгласен

		Напълно съгласен	По-скоро съгласен	По-скоро несъгласен	Напълно несъгласен
1	Постоянно забелязва някакви модели в нещата.				
2	Обикновено се концентрира по-скоро върху цялата картина, отколкото върху отделни детайли.				
3	В група успява лесно да следи разговорите между няколко участника.				
4	Ако има прекъсване, може лесно да се върне към това, което е правел/а.				
5	Често се оказва, че не знае как да поддържа разговор				
6	Добър/а е в леки социални разговори.				
7	Когато беше по-малък/малка обичаше да играе игри „на ужким“ с други деца.				
8	Трудно й/му е да си представи какво би било да бъде някой друг.				
9	Намира социалните ситуации за лесни.				
10	Трудно се сприятелява.				

Изчисляване на резултат: Отговор „Напълно съгласен“ или „По-скоро съгласен“ на айтеми **1, 5, 8 и 10** получава 1 точка. Отговор „Напълно несъгласен“ или „По-скоро несъгласен“ на айтеми **2, 3, 4, 6, 7 и 9** се оценява с 1 точка. Когато общият сбор е **6 точки или повече** детето следва да бъде насочено към специалист за диагностично оценяване.

Приложение: Тази версия на теста е препоръчана в NICE clinical guideline CG142. www.nice.org.uk/CG142

Източник: Allison C, Auyeung B, and Baron-Cohen S, (2012). *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 51(2):202-12.

Autism Spectrum Quotient (AQ) - Allison, C. Auyeung, B. & Baron-Cohen, S. (2012) (Превод на български: Д. Маслинкова, С. Стайкова, А. Аврамова, Н. Полнарева, Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“, УМБАЛ „Александровска“, 2022)

